






Ackerbohnen



Unkrautbekämpfung Restverunkrautung kann toleriert werden

Problem	Produkt	Hinweis	BCD
Vorauflauf	3 ltr Boxer ^{NT102}	bis 5 Tage nach Saat	*5,5
breite Mischverunkrautung	+ 1,75 - 2,2 ltr StompAqua ^{NT 108}		10,20,20
Klette Kreuzblütler	oder + 0,25 ltr Centium 36 CS ^{NT 101}	Clomazone Wirkstoff kann zu den aus dem Rapsanbau bekannten Aufhellungen führen	 -
Spritzfolge - Vorauflauf	→ 1,3 - 1,75 ltr StompAqua ^{NT 108}	Vorlage bis max. 5 Tage nach Saat im Keimblattstadium der Unkräuter, Sonnenschein ist Voraussetzung für gute Wirkung	10,20,20
- Nachauflauf	→ 1 ltr Basagran		 -
<p><u>Auflagen Basagran:</u> Keine Anwendung vor dem 15. April eines Jahres. Keine Anwendung auf Böden mit einem organischen Kohlenstoffgehalt (C org.) < 1 %. Keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger Sand und schwach toniger Sand.</p>			
oder <u>nur Nachauflauf</u> im Splitting	je 0,75 - 1 ltr Basagran	2- malige Spritzung jeweils im Keimblattstadium der Unkräuter begrenzt Wirkungsspektrum bis max. 5 cm Wuchshöhe der Bohnen	 -


Ungräser nur Blattwirkung

Gräser	1 ltr Fusilade Max ^{NT101}	außer Jährige Risppe und FOP- resistenter Ackerfuchschwanz (AF)	 -
Gräser <u>resistenter AF</u> Niederhaltung Quecke	oder 1,0 - 2,5 ltr Focus Ultra ^{NT 101} 1,0 - 2,5 ltr Dash	außer Jährige Risppe max. Aufwandmenge 5 ltr Focus Ultra + 5 ltr Dash zur Niederhaltung der Quecke	 -

Fungizide

Botrytis F. Mehltau Brennflecken	1 ltr Ortiva	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> beide evtl. auch in Tankmischung mit reduzierten Aufwandsmengen </div>	alle Zulassungen nach § 18a vorbeugend	 ***
Botrytis Rost E. Mehltau*	oder 1 ltr Folicur		* (§ 18a geg. E. Mehltau) heilend und vorbeugend	 **5

Insektizide

beißende und saugende Insekten	75 ml Karate Zeon ^{NT 103}	§ 18a Zulassung	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> zusammen mit Folicur bienengefährlich B2; erst abends nach Bienenflug bis 23.00 Uhr spritzen </div>	 *5,10
	oder 150 g Lambda WG ^{NT103}			§ 18a Zulassung
saugende Insekten	evtl. + 300 g Pirimor / Pirimicarb	gegen versteckt sitzende Blattläuse		-