AUSSAAT 2023

Schwerpunktsortiment

Sommergetreide

TREDE & VON PEIN
LANDHANDEL UND MISCHFUTTERWERKE

Sommerweizen

Broca (A) Überragend in der späteren Herbstaussaat, Top in der Frühjahrsaussaat. Daher sehr Saatzeitflexibel. Mittlere Reife mit mittleren Gesundheitsprofil macht ihn für jeden Standort interessant.

Winter-Frostbestellung	Vegetationsbeginn	Spätsaat bis April
370 - 400 Kö/m²	280 - 320 Kö/m²	380 - 420 Kö/m²

Sommergerste

RGT Planet Im Ertrag nach wie vor die Nummer 1! Passt auf alle Standorte, spielt ihre Stärken auf besseren Standorten aus.
Muss gerade im intensiven Anbau konsequent eingekürzt werden und dankt eine intensive Fungizidstrategie.

Lexy Durch ihre Robustheit in unbehandelter und behandelter Stufe hohe und stabile Erträge. Die Strohstabilität und gute Gesundheit macht sie besonders für sehr leichte Standorte Interessant. Sie zeichnet sich durch eine hohe Trockentoleranz aus.

früh	mittel	spät
280 - 310 Kö/m²	300 - 350 Kö/m²	340 - 370 Kö/m²

Hafer

Lion Nach mehrjährigen Anbauerfahrungen der Klassiker im Haferanbau. Überzeugt auch auf leichteren Standorten und bei späteren Saaten mit guten Qualitäten. Ist gefragt bei den Schälmühlen. Auf Mehltau muss geachtet werden!

Fritz NEU Hohe Erträge mit früher Reife und guten Qualitätseigenschaften. Kann auch vor Raps stehen. Durch die Großrahmigkeit sehr gute Unterdrückungseigenschaften. Gleichmäßige Abeife von Korn und Stroh. Die Standfestigkeit muss mit Wachstumsreglern abgesichert werden!

Unsere Hafersorten aus eigener Produktion werden standardgemäß mit Nährstoffen angebeizt.

früh	mittel	spät
280 - 310 Kö/m²	300 - 350 Kö/m²	340 - 370 Kö/m²

Anbauhinweise Sommerweizen

Allgemein Durch hohe Frosttoleranz ist eine Aussaat schon ab Januar möglich. Verlangt tiefgründige Böden (pH-Wert = 6,5-7); auf leichten Böden ist gesicherte Wasserversorgung wichtig! Fungizideinsatz befallsorientiert, v.a. Septoria beachten; meist reichen 2 Fungizidbehandlungen in EC 37 und EC 55 aus.

Düngung Dreiteilung der Gaben, organ. Düngung gut möglich. Startdüngung mit 60 - 80kg N als NPK-Dünger zur Saat einarbeiten, Start- und Schossergabe sollten 80% der geplanten N-Menge umfassen.

Anbauhinweise Sommergerste

Allgemein bis Mitte April möglich in gut abgetrocknetes Saatbett, Zielährenzahl: 550 - 600 Ähren / m². Eine Wachstumsreglergabe in EC 39 oft ausreichend, dann mit Fungizid kombinieren.

Düngung Grunddünger und 2/3 der N-Menge vor der Saat einarbeiten, Gabenteilung auf leichten Flächen.

Anbauhinweise Hafer

Allgemein so früh, wie möglich, möglichst bis Ende März in gelockertes Saatbett, Zielrispenzahl 400 - 500 Rispen/m². Spätere Saaten Anfang April mit modernen Sorten unproblematisch. Gesicherte Wasserversorgung ist der wichtigste Punkt! Wachstumsreglergabe je nach Standort; Mehltau, Haferkronenrost und Läusebefall (Virusübertragung) beachten.

Düngung hohes N-Aneignungsvermögen; Kali-Versorgung beachten! Grunddünger vor der Saat zu 2/3 mit einarbeiten und bis EC 25 spätestens abschließen.

Nährstoffentzug nur Kornabfuhr / mit Strohabfuhr					
	N_{Soll}	P	K	Mg	S
Sommergerste (70dt)	175	56 / 72	42 / 137	14 / 20	20
Sommerweizen (70dt)	200	56 / 73	42 / 120	14 / 25	20
Hafer (55dt)	130	44 / 62	33 / 135	11 / 20	15

Ihr starker Partner für die Landwirtschaft

Bei Sommerungen erfolgt grundsätzlich **keine Rücknahme**!

Verpackung: Papiersack und BB (Hafer 800 kg, Rest 500 kg)

Trede & von Pein GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 2-4
25524 Itzehoe

Ihre Ansprechpartner für Getreidesaatgut und Sortenberatung:
Mareike Thiele Tel.: 04821-6000-661
Helge Treuherz Tel.: 04821-6000-665 | Mobil: 0178-62 000 15

TREDE & VON PEIN
LANDHANDEL UND MISCHFUTTERWERKE